

BIOSPEOLOGICA

XIV⁽¹⁾

ESSAI

D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

DES

SILPHIDES CAVERNICOLES ⁽²⁾

PAR

Dr R. JEANNEL

Laboratoire Arago (Banyuls-sur-Mer)

SOMMAIRE

	Pages
A. — GÉNÉRALITÉS	2
I. — Les <i>Bathysciae</i> forment un groupement polyphylétique.....	2
II. — Le grand genre <i>Bathyscia</i> Schiödte doit être morcelé.....	4
B. — TABLEAU DESCRIPTIF DES GROUPES.....	6
C. — TABLEAUX DESCRIPTIFS DES GENRES.....	7
I. — Tableau des genres du groupe <i>Euryscapiti</i>	7
Séries évolutives du groupe <i>Euryscapiti</i>	11
II. — Tableau des genres du groupe <i>Gynomorphi</i>	15
Séries évolutives du groupe <i>Gynomorphi</i>	17
III. — Tableau des genres du groupe <i>Brachyscapiti</i>	19
Séries évolutives du groupe <i>Brachyscapiti</i>	23
IV. — Tableau des genres du groupe <i>Antroherpona</i>	25
Séries évolutives du groupe <i>Antroherpona</i>	26
D. — CATALOGUE DES ESPÈCES DES <i>Bathysciae</i>	26
I. — Groupe <i>Euryscapiti</i>	26
II. — Groupe <i>Gynomorphi</i>	36
III. — Groupe <i>Brachyscapiti</i>	40
IV. — Groupe <i>Antroherpona</i>	45
V. — <i>Species incertae sedis</i>	46
E. — INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.....	47

(1) Voir pour BIOSPEOLOGICA I à XIII, ces ARCHIVES, tome VI, VII, VIII et IX de la 4^e série, et tome I, II et IV de la 5^e série.

(2) Cet Essai sera suivi d'ici peu de temps d'un travail plus complet de Révision des *Bathysciae*, où se trouveront les descriptions des espèces et une étude plus détaillée de leur distribution géographique.

A. — GÉNÉRALITÉS

Si on laisse de côté les deux espèces américaines, *Adelops hirta* Tellkampff, du Kentucky et *Adelopsis heterocera* Portevin, de Bolivie, qui présentent d'étroites affinités avec les *Plomaphagus*, tous les Silphides cavernicoles ou Silphides aveugles de l'Ancien monde se rangent dans la tribu des *Bathysciae*, sensu G. H. HORN (1880, p. 251), groupement bien caractérisé par l'écartement des hanches postérieures, la tétramérie des tarses antérieurs des femelles, l'atrophie ou la plupart du temps la disparition complète de l'œil.

De nombreux auteurs ont cherché à subdiviser la tribu des *Bathysciae* ; je ne puis ici entrer dans le détail des classifications de SCHAUFUSS (1861), ABEILLE DE PERRIN (1878), REITTER (1885, 1886, 1889), SEIDLITZ (1889), GANGLBAUER (1899), J. MÜLLER (1901), REITTER (1908). Tous ces auteurs cherchent à placer les diverses espèces qu'ils connaissent de *Bathysciae* en une seule série linéaire ; ils s'appuient pour cela sur les caractères d'adaptation et s'en servent pour opérer quelques groupements de genres (Bathysciites, Pholeuones, Oryotites, Lep-toderites), commodes pour le rangement général. Et cette idée que les Silphides aveugles se disposent en une série évolutive unique, déjà émise par SEIDLITZ (1889), qui propose de réduire les genres déjà existants à des séries d'espèces dans un grand genre unique, et par J. MÜLLER (1901, p. 22) est catégoriquement exprimée par E. REITTER (1908, p. 103) lorsqu'il dit :

« ...dass die blinden Silphiden von der Gestalt eines *Lep-toderus* an bis zur wenig differenzierten Gattung *Bathyscia* eine kontinuierliche Kette von Zwischenformen darstellen. und nirgends eine abgestufte Grenze in den Entwicklungsphasen dieser Gattungen zu bemerken sei, weshalb der Versuch Gattungsgruppen zu umgrenzen, untunlich wäre. »

Tel n'est pas mon avis. La tribu des *Bathysciae* ne renferme pas une chaîne continue de genres depuis *Bathyscia*

jusqu'à *Leptodirus* ; c'est au contraire un groupement nettement polyphylétique. Il est possible que son origine première puisse se ramener à une souche unique ; je ne discute pas cette question pour le moment. Je soutiens seulement que les formes actuelles sont le résultat de l'évolution parallèle de plusieurs phylums actuellement isolés. Deux facteurs paraissent avoir provoqué et influencé cette évolution : c'est d'abord l'*isolement génital*, résultant de variations précoces dans la structure de l'organe copulateur mâle et auquel on doit attribuer l'origine des grandes subdivisions que je définirai plus loin ; c'est ensuite l'*isolement géographique*, résultant de la localisation de certaines colonies dans des groupes de grottes, auquel on peut attribuer la formation des espèces et même des genres actuels.

Les genres de la tribu des *Bathysciæ* forment quatre grands groupes principaux ; dans chacun de ces groupes ils se disposent en un certain nombre de séries que définissent les mêmes caractères fondamentaux et surtout la même structure de l'organe masculin et dans lesquelles les genres que je propose représentent des stades évolutifs successifs.

Ces séries évolutives sont parallèles, c'est-à-dire que les stades se répètent dans le même ordre dans chaque série. Deux espèces au même stade évolutif, mais appartenant à deux séries distinctes se ressemblent par convergence. C'est sur ces ressemblances qu'étaient fondées les anciennes subdivisions en Bathyscides, Pholeuones, Leptoderites, subdivisions mauvaises, puisqu'elles étaient basées sur des caractères de convergence et qu'elles réunissaient des formes d'origines diverses pour séparer au contraire des espèces proche parentes. C'est aussi sur des ressemblances dues à la convergence qu'est basé le grand genre *Bathyscia* tel qu'il est encore admis à l'heure actuelle.

Ces séries évolutives ont des distributions géographiques continues et chacune d'elles est spéciale aux grottes d'une région naturelle bien définie. Il existe des régions cavernicoles caractérisées par leur série : c'est par exemple les Pyrénées

(série de *Speonomus*), les Alpes françaises (série de *Cytodromus*), la Carniole (série de *Leptodirus*), la Bosnie-Herzégowine (série d'*Apholeuonus*), les monts de Bihar (série de *Drimeotus*), etc...

Mes groupements génériques seront donc naturels et bien préférables en ce sens au groupement artificiel, à distribution géographique discontinue, qu'était l'ancien genre *Bathyscia*.

Ces séries évolutives ne sont pas toujours complètes, soit parce qu'un certain nombre de leurs stades n'a pu se conserver jusqu'à nous, soit par suite d'un arrêt de leur évolution, soit encore parce que nos connaissances sur la faune cavernicole de certains pays ne sont pas assez avancées (par exemple la série d'*Hexaurus*, en Albanie). Il en est cependant de complètes et certaines, celle d'*Apholeuonus*, par exemple, constituent bien « die kontinuierliche Kette » dont parle REITTER.

Une première conséquence de l'existence de ces séries évolutives est la nécessité où on se trouve de morceler le grand genre *Bathyscia* ; et cela me conduit aux considérations suivantes :

C'est sous le nom générique de *Bathyscia* Schiödte qu'ont été décrits la plupart des Silphides aveugles d'Europe ; le Catalogue Reitter (1906) énumère près de 150 espèces dans ce genre. Et pourtant si les descripteurs qui suivirent SCHIÖDTE avaient seulement jeté un coup d'œil sur la claire diagnose générique de l'auteur danois, ils auraient vu certainement que bien peu de leurs espèces pouvaient entrer dans le genre *Bathyscia*.

SCHIÖDTE (1849 p. 10) dans sa diagnose générique dit très explicitement : « ...*Tarsi antici* 4 *articulati*, *posteriores* 5 *articulati* ». Des différences sexuelles il ne dit rien sauf pour *B. byssina* (ibidem, p. 10) : « *Tarsi antici maris latius dilatati* » et pour *B. montana* (ibidem, p. 11) : « *Tarsi antici maris vix dilatati* ». De plus il donne de *B. montana* de bonnes figures et en particulier celle d'un tarse antérieur mâle tétramère (pl. II, fig. 1 h).

Le malheur a voulu que *B. byssina* soit resté introuvable et que *B. montana* soit si petit que son étude est fort délicate.

Tous les auteurs qui suivirent SCHIÖDTE, ayant à décrire des formes nouvelles à tarsi antérieurs mâles pentamères, n'hésitèrent pas, sans se donner la peine de contrôler les dires de l'auteur danois, à admettre d'un commun accord que les tarsi antérieurs mâles de *B. montana* devaient aussi être pentamères. En réalité il n'en est rien. *B. montana* possède des tarsi antérieurs mâles tétramères ; ceux du *B. byssina*, il est vrai, sont pentamères, mais la diagnose générique de SCHIÖDTE étant parfaitement claire et catégorique, l'auteur n'ayant pas désigné lui-même laquelle des deux espèces qu'il décrivait devait être considérée comme *espèce type*, il est bien évident que c'est celle qui correspond le mieux aux caractères énumérés, c'est-à-dire *montana*, qui doit être prise pour typique.

Donc dans le genre *Bathyscia* Schiödte les tarsi antérieurs des mâles sont tétramères.

Le résultat de tout ceci est que ABEILLE DE PERRIN (1878, p. 147) n'aurait pas dû caractériser ses *Aphaobius* par la tétramérie de leurs tarsi antérieurs mâles, mais par la forme de leur prothorax ;

que GANGLBAUER (1902, p. 48) n'aurait pas dû joindre les *B. narentina*, *dorotkana*, *Gobanzi*, etc. aux *Aphaobius* parce que les tarsi antérieurs des mâles étaient tétramères, mais bien les considérer comme des *Bathyscia* typiques ;

que tous les auteurs qui décrivirent des *Aphaobius* depuis 1902 auraient dû appeler *Bathyscia*, s. str., ce qu'ils appelaient *Aphaobius* et réciproquement donner un nouveau nom à ce qu'ils appelaient *Bathyscia*, s. str. ;

que REITTER (1908, p. 117) a eu tort de créer la coupe *Bathyscina* pour les formes à tarsi antérieurs mâles tétramères et chez qui les côtés du prothorax sont régulièrement arqués, car, ainsi définis, ses *Bathyscina* sont exactement synonymes des *Bathyscia* de Schiödte.

Moi-même, dans *Biospeologica* V (1908, p. 298), j'ai donné aux *Bathyscina* le rang de genre, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de disséquer *B. montana* et de constater

dans quel gâchis était tombée la nomenclature des *Bathysciae*.

Donc seules les espèces dont les tarses antérieurs des mâles ont 4 articles ont le droit d'être rangées dans le genre *Bathyscia* Schiödte et *Bathyscina* Reitter doit en être considéré comme synonyme. C'est en partant de ce principe que j'ai dû répartir dans un certain nombre de nouveaux genres les espèces qu'on avait coutume de nommer à tort *Bathyscia*.

La tribu des *Bathysciae* comprend les quatre grands groupes suivants :

B. — TABLEAU DES GROUPES

- I. Antennes insérées sur le tiers moyen du front, à deuxième article allongé, plus long ou à peu près aussi long que le troisième.
Ongles des tarses simples.

A. Tarses antérieurs des mâles de 4 articles.

Groupe II. — GYNOMORPHI.

B. Tarses antérieurs des mâles de 5 articles.

1^o Premier article des antennes aussi long que le second.

Sculpture des élytres variable.

Groupe I. — EURYSCAPITI.

2^o Premier article des antennes plus court que le second.

Élytres toujours ponctués, sans strie suturale.

Groupe III. — BRACHYSCAPITI.

- II. Antennes insérées sur le quart postérieur du front, à deuxième article très court et très épais, pas plus long que le tiers du troisième. Ongles des tarses falciformes.

Groupe IV. — ANTROHERPONA.

Chacun de ces groupes comprend un certain nombre de genres groupés en quelques séries évolutives. Comme ces séries évolutives sont surtout caractérisées par des structures particulières de l'organe copulateur mâle, et qu'il est préférable dans la mesure du possible de ne pas faire entrer dans des tableaux de détermination des caractères dont l'étude nécessite

des préparations microscopiques, je donnerai d'abord pour chacun des groupes un tableau de détermination des genres et je passerai ensuite en revue les différentes séries dans lesquelles il convient de les grouper.

C. — TABLEAU DES GENRES

I. — GROUPE EURYSCAPITI

Ce groupe comprend un grand nombre de formes archaïques dispersées dans toute l'étendue de la région paléarectique. De plus il renferme de belles séries de formes cavernicoles à l'ouest de l'arc alpin, c'est-à-dire en France et en Espagne et sur le littoral tyrrhénien de l'Italie. Nous verrons que les grottes situées en Autriche, Hongrie et dans les Balkans, c'est-à-dire à l'est de l'arc alpin, sont au contraire peuplées par les trois autres groupes de *Bathysciae*, à l'exclusion des *Euryscapiti*.

TABLEAU DES GENRES DES EURYSCAPITI

1. Forme cylindrique, nullement atténuée en arrière. Tête incomplètement rétractile, sans yeux, sans carène occipitale saillante en arrière du front. Prothorax aussi large que les élytres, à côtés régulièrement arqués. Élytres sans strie suturale, laissant le pygidium à nu. Mésosternum plan, sans carène, mais portant à son milieu une petite dent. Massue des antennes énorme, cinq fois plus épaisse que le premier article. Très petite taille (1 mm.). Type : *Bathyscia sibirica* Reitt. gen. nov. **Sciaphyes**.
- Forme elliptique, atténuée en arrière ou ovalaire. Lorsque le prothorax est large et que ses côtés sont arqués, la tête porte toujours une carène occipitale saillante et le mésosternum est plus ou moins caréné. Pygidium caché, sauf chez quelques genres à prothorax étroit. Massue des antennes au plus deux fois aussi épaisse que le premier article. 2
2. Premier article du tarse intermédiaire très dilaté chez les mâles. Des yeux pigmentés. Organe copulateur mâle à styles latéraux atrophiés, filiformes, terminés par une soie ; sac interne du pénis armé de dents nombreuses disposées par paquets symétriques. Type : *A. bosnica* Reitt. gen. **Adelopsella**.

- Premier article du tarse intermédiaire non dilaté chez les mâles. Pas d'yeux (sauf chez les *Bathysciola* du groupe du *Peyroni* Ab., qui ont tous des yeux rudimentaires et non pigmentés). Organe copulateur mâle à styles latéraux bien développés et terminés par plusieurs soies. 3
- 3. Carène mésosternale élevée, arrondie, prolongée en arrière par une longue saillie qui repose sur la surface du métasternum. Élytres non soudés. Pas de pièce en Y au fond du sac interne du pénis. 4
- Carène mésosternale variable, sans prolongement postérieur (sauf chez *Bathysciola Halbherri* Reitt.). Élytres soudés. . . . 5
- 4. Sac interne du pénis armé d'un stylet chitineux, inséré sur la paroi dorsale, libre dans la cavité du sac et dirigé en avant. Type : *S. arcanus* Schauf. gen. **Speocharis**.
- Sac interne du pénis sans stylet, mais pourvu de grosses dents irrégulièrement placées. Type : *B. triangulum* Sharp . . . gen. **Breullia**.
- 5. Article II des antennes toujours aussi épais que l'article I. bien plus épais et plus long que l'article III. 6.
- Article II des antennes toujours plus grêle que l'article I. à peine plus épais et à peu près de même longueur que l'article III. . . 10.
- 6. Forme allongée. Prothorax campanuliforme, un peu plus étroit que les élytres, à angles postérieurs très saillants. Élytres terminés en pointes divariquées qui dépassent beaucoup le sommet du pygidium. Type : *S. Ehlersi* Dieck. . . . gen. **Spelaeochlamys**.
- Forme variable. Prothorax aussi large que les élytres, à côtés régulièrement arqués 7.
- 7. Forme très courte, presque hémisphérique. Ponctuation grosse et éparse sur tout le corps. Sommet des élytres dépassant amplement le pygidium, parfois déhiscent. Organe copulateur mâle à styles latéraux plus courts que le pénis ; sac interne non différencié. Type : *A. tropicus* Ab. gen. **Anillochlamys**.
- Forme ovale, moins convexe. Ponctuation fine, plus forte sur les élytres que sur le prothorax. Sommet des élytres moins long. Sac interne du pénis différencié. 8.
- 8. Organe copulateur mâle à styles latéraux très larges, aplatis latéralement en forme de valves. Sac interne du pénis sans pièce en Y, mais pourvu d'une file longitudinale et ventrale de grosses dents dirigées en avant. Type : *Bathyscia Erberi* Schauf.
. gen. nov. **Pholeuonella**.
- Organe copulateur mâle à styles latéraux grêles. Sac interne du

- pénis pourvu d'une pièce en Y et de bandelettes longitudinales et dorsales 9.
9. Sommet du pénis aplati ; lame basale longue et arrondie. Styles latéraux terminés par un nombre variable de soies grêles et plus ou moins longues. Type : *Bathyscia Aubei* Kies. gen. nov. **Bathysciola**.
- Sommet du pénis effilé et pointu ; lame basale droite et étroite. Styles latéraux terminés par trois très grandes épines falciformes à pointe mousse. Type : *P. Spagnoloï* Fairm. . . gen. **Parabathyscia**.
10. Élytres ponctués, sans stries transversales. La strie suturale, lorsqu'elle existe, n'est pas parallèle à la suture ; elle s'efface en avant. Premier article du tarse postérieur plus court que les deux suivants réunis 11.
- Élytres striolés en travers. La strie suturale, lorsqu'elle existe, est parallèle à la suture ; elle s'efface en arrière. Premier article du tarse postérieur plus long que les deux suivants réunis. . . 16.
11. Strie suturale nulle ou à peine indiquée. Pubescence de tout le corps longue, dense, redressée à 45°. Type : *D. caudatus* Ab. . . gen. **Diaprysius**.
- Strie suturale entière, bien marquée. Pubescence courte et couchée. 12.
12. Base du prothorax fortement bisinuée. Angles postérieurs du prothorax très saillants. 13.
- Base du prothorax rectiligne ou régulièrement cintrée. Angles postérieurs du prothorax non saillants. 14.
13. Côtés du prothorax régulièrement arqués, non sinués. Prothorax plus large que les élytres. Article I du tarse postérieur pas plus long que l'article II. Type : *Bathyscia Tarissani* Bed. gen. nov. **Royerella**.
- Côtés du prothorax sinués avant la base. Prothorax plus étroit que les élytres. Article I du tarse postérieur un peu plus long que l'article II. Type : *C. dapsoïdes* Ab. . . . gen. **Cytodromus**.
14. Prothorax à peine plus étroit que les élytres, à côtés non sinués, à angles postérieurs arrondis. Carène mésosternale peu élevée, arrondie. Article I du tarse postérieur pas plus long que l'article II. Type : *S. galloprovincialis* Fairm. . . gen. **Speodiaetus**.
- Prothorax bien plus étroit que les élytres, à côtés nettement sinués. Carène mésosternale très basse. Article I du tarse postérieur un peu plus long que l'article II. 15.
15. Forme épaisse. Prothorax non cordiforme, à angles postérieurs

- émoussés. Élytres à peine deux fois aussi longs que larges. Type : *T. Bucheti* Dev. gen. **Troglochromus**.
- Forme très allongée. Prothorax cordiforme, à angles postérieurs vifs. Élytres trois fois aussi longs que larges. Type : *I. Nambeui* Arg. gen. **Iserus**.
16. Prothorax aussi large que les élytres, à côtés régulièrement arqués et non sinués. Carène mésosternale élevée formant un angle vif, denté. Type : *S. pyrenaicus* Lesp. gen. **Speonomus**.
- a). Coloration brun foncé. Tête très petite. Prothorax semi-circulaire, deux fois aussi large que long. Ongles très courts. subgen. **Phacomorphus**.
- b). Coloration testacé clair. Tête plus grosse. Prothorax une fois et demie aussi large que long. Ongles longs. subgen. **Speonomus**, s. str.
- Prothorax plus étroit que les élytres, à côtés toujours sinués avant la base. 17.
17. Prothorax plus large que long. 18.
- Prothorax plus long que large. 21.
18. Prothorax campanuliforme, à peine plus étroit que les élytres. Carène mésosternale élevée. Styles latéraux de l'organe copulateur terminés en massue et portant trois soies et une brosse de petits poils. Type : *B. Jeanneli* Ab. gen. **Bathysciella**.
- Prothorax non campanuliforme, rétréci en arrière. 19.
19. Prothorax non cordiforme, peu rétréci en arrière, à angles postérieurs défléchis. Strioles transversales des élytres grossières et écartées. Styles latéraux de l'organe copulateur sans brosse de poils. Type : *P. Kiesenwetteri* Dieck. gen. **Perrinia**.
- Prothorax cordiforme, bien rétréci en arrière, à angles postérieurs non défléchis. 20.
20. Prothorax transverse. Antennes plus courtes que le corps, à article VIII plus court que ses voisins. Carène mésosternale élevée. Type : *T. Gavoyi* Ab. gen. **Troglophyes**.
- Prothorax presque carré, bien plus étroit que les élytres. Antennes aussi longues que le corps, à article VIII aussi long que ses voisins. Carène mésosternale nulle. Type : *T. Ferreri* Reitt. gen. **Troglocharinus**.
21. Élytres dépassant amplement le sommet du pygidium. Tarses antérieurs des mâles plus larges que le sommet du tibia. Antennes longues et très épaisses. Styles latéraux de l'organe copulateur mâle avec une brosse de poils. Type : *T. Mestrei* Ab. gen. **Trocharanis**.

— Élytres plus courts que l'abdomen, laissant à nu la pointe du pygidium. Tarses antérieurs des mâles plus étroits que le sommet du tibia. Antennes très longues et très fines. Styles latéraux de l'organe copulateur mâle sans brosse de poils. Type : *A. Querihaci* Lesp. gen. **Antrocharis**.

SÉRIES ÉVOLUTIVES DES EURYSCAPITI

Le groupe comprend des formes archaïques à affinités douteuses et six séries bien distinctes.

A. — Genres archaïques. — Les uns paraissent isolés et leurs affinités sont au moins difficiles à dégager (*Sciaphyes*, nov., *Adelopsella* Jeann.); d'autres renferment des séries d'espèces dont beaucoup sont certainement voisines de la souche des autres séries (*Bathysciola*, nov.). C'est ainsi que les *Bathysciola* du groupe d'*Aubei* Kicsw. se placent par la structure de leur organe copulateur à la base de la série de *Cytodromus*; que les *Bathysciola* du groupe de *Schiödtei* rappellent les *Speonomus*. Ces genres renferment des formes frondicoles, présentant fréquemment des yeux rudimentaires (*Adelopsella*, *Bathysciola* du groupe de *Peyroni*) et des cavernicoles peu modifiés. On les rencontre dans toute la région paléarctique.

B. — Série de *Pholeuonella*. — Organe copulateur mâle à




FIG. 1. Pénis de *Bathysciola schiödtei* Kiesenw., face dorso-latérale, $\times 75$.

FIG. 2. Pénis de *Pholeuonella Erberi* Schauf., face latérale gauche, $\times 112$.

styles latéraux comprimés en forme de valves, à sac interne sans pièce en Y, mais pourvu d'une rangée longitudinale et ventrale de grosses dents recourbées en avant. Aspect extérieur des *Bathysciola*. Renferme le genre *Pholeuonella*, nov., frondicole, de Dalmatie méridionale.




FIG. 3. Pénis de *Parabathyscia Wollastoni* Jans., face dorsale, $\times 70$.

C. — Série de *Parabathyscia*. — Organe copulateur mâle à styles latéraux terminés par trois énormes épines falciformes, émoussées au sommet; sommet du pénis en forme de longue pointe grêle et acérée; sac interne pourvu d'une pièce en Y. Aspect extérieur de *Bathysciola*. Contient le seul genre *Parabathyscia* Jeann., avec des formes frondicoles et cavernicoles. (Angleterre, Normandie, Gers, Ligurie, Corse.)

D. — Série de *Spelaeochlamys*. — Élytres très amples, tendant à former des pointes divariquées. Ponctuation égale et régulière sur tout le corps. Organe copulateur mâle à styles latéraux courts, sans sac interne nettement limité. Renferme des formes globuleuses (*Anillochlamys* Jeann.) et allongées (*Spelaeochlamys* Dieck). Sud de l'Espagne.

E. — Série de *Speocharis*. — Carène mésosternale formant en arrière une longue saillie en forme d'épine, qui repose sur la surface du métasternum. Organe copulateur à sac interne bien



FIG. 4. Pénis de *Speocharis autumnalis* Escal., face latérale gauche, $\times 112$.

limité, sans pièce en Y, mais armé d'épines ou de dents souvent soudées en un stylet dorsal. Renferme les genres



FIG. 5. Sac interne du pénis de *Bathysciola Schiödtei* Kiesenw., face dorsale, avec sa pièce en Y à l'abouchement du canal éjaculateur, $\times 158$.



FIG. 6. Sac interne du pénis de *Speocharis Breuili* Jeann., face dorsale, avec son stylet et les deux paquets d'épines antérieurs, $\times 158$.



FIG. 7. Sac interne du pénis de *Breuilia triangulum* Sharp, face dorsale, avec ses dents chitineuses éparses, $\times 75$.



FIG. 8. Sac interne du pénis de *Anillochlamys tropicus* Ab., face dorsale, sans pièces chitineuses sur son cul-de-sac, $\times 112$.

Speocharis Jeann., *Breuilia* Jeann. (Côtes espagnoles du golfe de Gascogne.)

F. — Série de *Speonomus*. — Élytres striolés en travers, avec une strie suturale parallèle à la suture, pouvant s'effacer en arrière et souvent absente. Premier article du tarse postérieur au moins aussi long que les deux suivants

réunis. Organe copulateur fortement arqué, large à la base, à styles latéraux terminés par 3 soies et souvent une brosse de poils; sac interne pourvu d'une pièce en Y et de bandelettes longitudinales articulées volumineuses. Contient des genres cavernicoles très modifiés : *Speonomus* Jeann., *Bathysciella* Jeann., *Perrinia* Reitt., *Troglophyes* Ab., *Troglocharinus* Reitt., *Trocharanis* Reitt., *Antrocharis* Ab. (Pyrénées françaises et espagnoles.)

G. — Série de *Diaprysius*. — Pubescence du corps redressée à 45°. Élytres ponctués, sans strie suturale nette. Styles latéraux de l'organe copulateur terminés par cinq soies; sac interne pourvu d'une pièce en Y et de bandelettes longitudinales grêles. Renferme le genre *Diaprysius* Ab., cavernicole. (Cévennes.)

H. — Série de *Cytodromus*. — Élytres ponctués, à strie suturale toujours entière, profonde, non parallèle à la suture. Premier article du tarse postérieur bien plus court que les deux suivants réunis. Organe copulateur mâle semblable à celui des *Speonomus*, mais les styles latéraux portent seulement trois soies à leur sommet et les bandelettes longitudinales du sac sont très réduites. Renferme les genres cavernicoles : *Royerella*, nov., *Cytodromus* Ab., *Speodiaetus* Jeann., *Troglodromus* Dev., *Isereus* Reitt. (Alpes françaises, Provence.)

II. — GROUPE GYNOMORPHI

Le centre de dispersion du groupe est très certainement la côte de Dalmatie où ses représentants abondent. On les rencontre en outre en Bosnie-Herzégowine, en Carniole, et en général dans toute la région méditerranéenne orientale. Toutefois une espèce fait exception, c'est le *Speophyes lucidulus* Delar., qui se trouve dans les Cévennes.

TABLEAU DES GENRES DES GYNOMORPHI

1. Élytres portant une strie suturale. 2.
- Élytres sans trace de strie suturale. 3.
2. Des yeux pigmentés. Élytres striolés en travers. Méta sternum non caréné. Prothorax large, à côtés régulièrement arqués. Antennes à deux premiers articles épais et de même longueur. Organe copulateur mâle à styles latéraux terminés par 3 soies, à sac interne différencié, portant une pièce en Y. Type : *Bathyscia Lesinae* Reitt. gen. nov. **Phaneropella**.
- Pas d'yeux. Élytres sans stries transversales, ponctués. Prothorax large, à côtés régulièrement arqués. Méta sternum non caréné. Antennes à deux premiers articles épais et de même longueur. Organe copulateur mâle très petit, à sac interne différencié, pourvu d'une pièce en Y et de quelques nodules dorsaux. Type : *Bathyscia lucidula* Delar. gen. nov. **Speophyes**.
3. Carène mésosternale élevée, toujours prolongée en arrière par une carène méta sternale. 4.
- Carène mésosternale plus ou moins haute, sans prolongement méta sternal. 6.
4. Tibias intermédiaires avec 4 à 6 longues épines sur leur bord externe. Carène méta sternale occupant toute la longueur du segment. Tarses antérieurs des mâles grêles. Prothorax large, à côtés régulièrement arqués. Sac interne de l'organe copulateur pourvu d'une pièce en Y. Type : *Bathyscina Khevenhülleri* Mill. gen. nov. **Bathysciotes**.
- Tibias intermédiaires inermes. 5.
5. Tarses antérieurs des mâles légèrement dilatés. Carène méta sternale occupant toute la longueur du segment et formant entre les hanches postérieures une épine. Organe copulateur court et épais, à sac interne bien plus long que la gaine pénienne, sans pièce en Y, mais pourvu d'énormes baguettes chitineuses sur sa paroi dorsale. Type : *Bathyscina narentina* Mill. gen. nov. **Speonesiotes**.
- Tarses antérieurs des mâles grêles. Méta sternum caréné seulement sur sa moitié antérieure. Organe copulateur mâle très petit, très grêle, sans sac interne différencié. Type : *Bathyscina tristicula* Apf. gen. nov. **Bathyscidius**.
6. Premier article des antennes aussi long que le second. 7.
- Premier article des antennes plus court que le second. 10.
7. Carène mésosternale haute, entière. 8.
- Carène mésosternale nulle ou réduite à une petite dent. 9.

8. Prothorax large, à côtés régulièrement arqués. Organe copulateur mâle très petit, très grêle, tordu en S, sans sac interne différencié. Type : *B. montana* Schiödte gen. **Bathyscia**.
- Prothorax plus étroit que les élytres, à côtés sinués avant la base. Organe copulateur mâle développé, non tordu en S, pourvu d'un sac interne bien différencié, avec une pièce en Y et des bandelettes longitudinales. Type : *A. Milleri* Schmidt. gen. **Aphaobius**.
9. Élytres démesurément longs, dépassant de beaucoup la pointe du pygidium. Forme allongée, elliptique. Élytres striolés en travers. Tarses antérieurs des mâles bien plus larges que le sommet du tibia. Organe copulateur mâle très long, pourvu d'un sac interne bien plus court que la gaine pénienne, avec une pièce en Y et des bandelettes longitudinales. Type : *O. Schmidtii* Mill. gen. **Oryotus**.
- Élytres courts. Pygidium libre. Élytres non striolés en travers. Tarses antérieurs mâles grêles. Organe copulateur mâle très petit, très grêle, sans sac interne différencié. Type : *H. Merkli* Friv. gen. **Hexaurus**.
10. Dernier article des antennes bien plus long que le précédent. 11.
- Dernier article des antennes exactement de même longueur que le précédent. 13.
11. Côtés du prothorax régulièrement arqués. Prothorax aussi large ou presque aussi large que les élytres. Pygidium libre. Organe copulateur mâle très court et épais, avec une languette médiane sur la lame basale du pénis, sans pièce en Y au fond du sac interne. Type : *Bathyscina Matzenaueri* Apf. gen. nov. **Proleonhardella**.
- Côtés du prothorax sinués. Prothorax plus étroit que les élytres. Organe copulateur mâle, long et mince, avec une languette médiane au bord de la lame basale du pénis, sans pièce en Y au fond du sac interne. 12.
12. Pygidium libre. Forme ovoïde, convexe. Tarses antérieurs des mâles grêles. Type : *L. angulicollis* Reitt. gen. **Leonhardella**.
- Pygidium caché par les élytres. Forme parallèle, allongée, déprimée. Tarses antérieurs des mâles largement dilatés. Type : *A. Ottonis* Reitt. gen. **Anillocharis**.
13. Prothorax campanuliforme. Soies dressées des élytres très longues. Carène mésosternale à angle abattu. Type : *P. Ganglbaueri* Apf. gen. **Pholeuonopsis**.
- Prothorax rétréci à sa base. Soies dressées des élytres courtes. Carène mésosternale formant un angle très saillant. Type : *S. Leonhardi* Reitt. gen. **Silphanillus**.

SÉRIES ÉVOLUTIVES DES GYNOMORPHI

A. — Série de *Bathyscia*. — Organe copulateur mâle archaïque, très petit, très simple, très grêle, sans sac interne différencié ; trois soies au sommet de ses styles latéraux. Renferme les genres frondicoles : *Bathyscia* Schiödte, *Ba-*



FIG. 9. Pénis de *Bathyscia montana* Schiödte, face dorso-latérale, $\times 220$.




FIG. 10. Pénis de *Aphaobius Mölleri* Schmidt, face dorsale, $\times 75$.




FIG. 11. Pénis de *Oryotus Schmidt* Mill., face dorsale $\times 56$.

thyscidius, nov. Les stades cavernicoles font défaut. (Hongrie, Nord de la péninsule balkanique).

B. — Série de *Hexaurus*. — Organe copulateur mâle archaïque, très petit, très grêle, semblable à celui de la série précédente, mais les styles latéraux ne portent que deux soies à leur sommet. On ne connaît encore de cette série qu'un seul genre cavernicole assez modifié, *Hexaurus* Reitt. (Albanie).

C. — Série de *Speophyes*. — Élytres portant une strie suturale. Organe copulateur mâle différencié, avec un sac in-

terne pourvu d'une pièce en Y. Renferme deux genres : *Phaneropella*, nov., archaïque, pourvu d'yeux, frondicole et *Speophyes*, nov., cavernicole. (Dalmatie et Cévennes).

D. — Série de *Aphaobius*. — Premier article des antennes aussi long que le second. Pénis sans languette médiane sur le bord libre de sa lame basale; sac interne pourvu d'une pièce en Y. Contient des genres cavernicoles : *Bathysciotes*, nov., *Aphaobius* Ab., *Oryotus* Mill. (Carniole).

E. — Série de *Speonesiotes*. — Premier article des antennes plus court que le second. Antennes très grêles et aplaties. Métasternum caréné. Organe copulateur mâle tendant vers une forme courte et épaisse, avec un sac interne beaucoup plus long que la gaine pénienne, privé de pièce en Y, mais pourvu d'énormes baguettes longitudinales. Renferme des formes cavernicoles : gen. *Speonesiotes*, nov. (Dalmatie, Vénétie.)

FIG. 12. Sac interne du pénis de *Oryotus Micklitzii* Reitt., face dorsale; le canal éjaculateur s'abouche sur la face ventrale. $\times 112$.




FIG. 13. Pénis de *Speonesiotes Gobanzi* Reitt., face dorsale, montrant le grand développement du sac interne, $\times 75$.

F. — Série de *Leonhardella*. — Premier article des antennes plus court que le second. Antennes cylindriques. Métasternum non caréné. Organe copulateur mâle tendant vers une forme grêle et très allongée, avec un sac interne bien plus court que la gaine pénienne, sans pièce en Y ni baguettes volumineuses. Renferme

les genres cavernicoles : *Proleonhardella*, nov., *Leonhardella* Reitt., *Anillocharis* Reitt. (Bosnie. Herzégowine, Monténégro.)




FIG. 14. Pénis de *Proleonhardella Matzenaueri* Apf., face dorsale; le sac interne est semblable à celui de *Leonhardella*. $\times 112$.




FIG. 15. Pénis de *Leonhardella angulicollis* Reitt., face dorsale, $\times 72$.



FIG. 16. Pénis de *Anillocharis plutonius* Reitt., face dorsale, $\times 75$.

G. — Série de *Pholeuonopsis*. — J'ignore la structure de l'organe copulateur mâle dans cette série. Les élytres sont hérissés de soies redressées plus ou moins longues. Genres *Pholeuonopsis* Apf., *Silphanillus* Reitt. (Bosnie, Herzégowine.)

III. — GROUPE **BRACHYSCAPITI**

Les *Brachyscapiti* sont localisés dans les grottes dépendant du grand bassin du Danube moyen, c'est-à-dire de ses affluents Drave, Save, Theiss et Temes.

TABLEAU DES GENRES DES BRACHYSCAPITI

1. Tibias intermédiaires et postérieurs pourvus de 4 éperons bien développés et hérissés sur leur face externe d'épines aussi longues

- que les éperons. Élytres portant parfois des côtes saillantes. 2.
- Tibias intermédiaires et postérieurs pourvus de deux éperons internes bien développés ; les deux éperons externes font défaut ou sont extrêmement réduits ; la face externe des tibias est inermes ou porte des épines très courtes. Jamais de côtes saillantes sur les élytres. 5.
2. Forme hémisphérique. Saillie intercoxale du métasternum aussi large que le métasternum est long au milieu. Type : *M. Paveli* Friv. gen. **Mehadiella**.
- Forme déprimée. Saillie intercoxale du métasternum étroite. Élytres frangés de longs poils. 3.
3. Hanches postérieures presque contiguës. Prothorax aussi large que les élytres, à côtés régulièrement arqués. Pas de côtes saillantes sur les élytres. Pénis grêle, sans fossette dorsale, avec un sac interne sans pièces chitineuses. Type : *S. insignis* Friv. gen. **Sophrochaeta**.
- Hanches postérieures écartées. Prothorax plus étroit que les élytres, à côtés sinués. Pénis pourvu d'une profonde invagination en nid de pigeon sur sa face dorsale ; sac interne portant à son fond un filament chitineux médian accolé à la partie invaginée du conduit éjaculateur. 4.
4. Prothorax au moins aussi large que long. Élytres à côtes saillantes, à rebord marginal large, explané en gouttière. Type : *D. Kovacsi* Mill. gen. **Drimeotus**.
- a). Tibias intermédiaires et postérieurs exceptionnellement inermes, mais comprimés en lames de sabre. Hanches épineuses subgen. **Fericeus**.
- b). Tibias intermédiaires et postérieurs normalement épineux. Hanches inermes. subgen. **Drimeotus**, s. str.
- Prothorax plus long que large. Élytres sans côtes saillantes, à rebord marginal étroit, mais toujours bien visible de haut. Type : *P. angusticollis* Hampe. gen. **Pholeuon**.
- a). Côtés du prothorax rebordés sur toute leur longueur. Gouttière marginale des élytres plus large au milieu qu'en avant. subgen. **Parapholeuon**.
- b). Côtés du prothorax rebordés seulement dans leur moitié postérieure. Gouttière marginale des élytres régulière. subgen. **Pholeuon**, s. str.
5. Métasternum caréné. Antennes aplaties au sommet. 6.
- Métasternum non caréné. Antennes cylindriques. 7.
6. Élytres laissant à découvert le sommet du pygidium. Prothorax

- à peine aussi large que les élytres, peu arqué sur ses côtés. Organe copulateur mâle tordu en S, grêle, sans armature chitineuse à son sac interne. Pénis épineux au sommet. Type : *Bathyscia Freyeri* Mill. gen. nov. **Hohenwartia**.
- Élytres acuminés, dépassant la pointe du pygidium. Prothorax large, à côtés bien arqués. Organe copulateur mâle non tordu en S, épais, à styles latéraux terminés par de nombreuses soies, à sac interne très différencié, pourvu d'une pièce en Y et de baguettes chitineuses. Type : *Bathyscia byssina* Schiödt. gen. nov. **Bathyscelmorphus**.
7. Prothorax aussi large que les élytres, à côtés régulièrement arqués. Tête entièrement rétractile. Type : *Bathyscia Neumannii* Apf. gen. nov. **Proleonhardia**.
- Prothorax plus étroit que les élytres, à côtés toujours sinués ou rétrécis avant la base. Tête non rétractile. 8.
8. Élytres scaphoïdes, bien plus longs que l'abdomen. Tarses antérieurs des mâles largement dilatés. Organe copulateur mâle démesurément long, tordu en S, pourvu d'un sac interne très court, à peine aussi long que le tiers de la gaine pénienne, avec quelques pièces chitineuses paires sur ses parois. Type : *S. Pluto* Reitt. gen. **Spelaeodromus**.
- Élytres très amples et très convexes, laissant à découvert la pointe du pygidium (Formes physogastres). Tarses antérieurs des mâles peu dilatés. Organe copulateur mâle non tordu en S, sans pièces chitineuses paires sur les parois du sac interne. 9.
9. Prothorax comprimé latéralement, sans bords latéraux saillants, au moins deux fois aussi long que large. Téguments glabres. Organe copulateur mâle à styles non coudés, à sac interne absolument inerme, à peine différencié. Sommet du pénis épineux. Type : *L. Hohenwarti* Schmidt gen. **Leptodirus**.
- a). Fémurs étranglés au sommet. Tarses antérieurs des mâles grêles subgen. **Leptodirus**, s. str.
- b). Fémurs non étranglés au sommet. Tarses antérieurs des mâles dilatés subgen. **Astagobius**.
- Prothorax non comprimé latéralement, avec des bords latéraux toujours saillants, au plus une fois et demie aussi long que large. Téguments pubescents (sauf chez *Apholeuonus*). Organe copulateur mâle à styles latéraux épaissis et coudés au milieu de leur longueur, à sac interne pourvu d'une pièce chitineuse

- allongée, médiane et dorsale, en arrière de l'abouchement du canal éjaculateur et d'une grosse dent recourbée médiane et impaire, au milieu de sa face ventrale. 10.
10. Petite taille (2 à 3 mm.). Article VIII des antennes à peu près aussi long que large. 11.
- Grande taille (5 à 7 mm.). Article VIII des antennes au moins deux fois aussi long que large. 13.
11. Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci à sa base. Articles terminaux des antennes épaissis régulièrement depuis leur base jusqu'à leur sommet. Type: *L. Hilfi* Reitt. gen. **Leonhardia**.
- Prothorax campanuliforme, bien plus large que long. Articles terminaux des antennes brusquement épaissis dans leurs moitiés apicales (antennes noueuses). 12.
12. Tibias intermédiaires droits; tibias postérieurs arqués en dehors. Ponctuation forte. Type: *C. Matzenaueri* Apf. . gen. **Charonites**.
- Tibias intermédiaires arqués en dedans; tibias postérieurs droits. Ponctuation fine. Type: *A. Sequensi* Reitt. . . gen. **Adelopidius**.
13. Téguments glabres. Carène mésosternale élevée, dentée. Rebord marginal des élytres saillant. Type: *A. nudus* Apf. gen. **Apholeuonus**.
- Téguments pubescents. Carène mésosternale nulle, ou basse et non dentée. 14.
14. Bord postérieur du prosternum sans incisure médiane (cette incisure existe chez tous les autres genres de *Bathysciæ*). Prothorax bien plus long que large. Élytres à épaules saillantes, trois fois aussi longs que larges chez les mâles, deux fois seulement chez les femelles. Antennes très longues, dépassant la longueur du corps. Type: *P. sericeus* Schmidt gen. **Parapropus**.
- Bord postérieur du prosternum incisé sur la ligne médiane. Élytres au plus deux fois aussi longs que larges, semblables dans les deux sexes, à épaules non saillantes et à rebord marginal effacé de façon qu'aucune limite nette n'existe entre la surface de l'élytre et celle de l'épipleure. Antennes ne dépassant pas la longueur du corps 15.
15. Antennes insérées sur des saillies latérales du front. Prothorax très finement et très superficiellement ponctué, carré, peu convexe. Type: *H. pubescens* J. Müll. gen. **Haplotropidius**.
- Antennes insérées dans des fossettes peu profondes, limitées en arrière par une petite carène saillante. Prothorax fortement ponctué, plus long que large, convexe, presque cylindrique. Type: *P. Reitteri* Apf. gen. **Protobracharthron**.

SÉRIES ÉVOLUTIVES DES BRACHYSCAPITI

- A. — Série de *Drimeotus*. — Tibias intermédiaires et postérieurs à quatre éperons très développés, hérissés de fortes épines aussi longues que les éperons. Hanches postérieures distantes. Organe copulateur mâle de grande taille : pénis portant sur sa face dorsale une profonde fossette en nid de pigeon ; sac interne pourvu d'un filament médian accolé à la partie invaginée du canal éjaculateur. Renferme les genres : *Mehadiella* Csiki.




FIG. 17. Pénis de *Drimeotus Koracsi* Mill., face latérale gauche, avec sa fossette en nid de pigeon caractéristique, $\times 56$.




FIG. 18. Pénis de *Sophrochaeta insignis* Friv., face dorsale, avec son sac interne non différencié, $\times 75$.

- Drimeotus* Mill., *Pholeuon* Hampe. (Je place ici *Mehadiella* avec cette restriction que la structure de son organe copulateur mâle m'est inconnue.) (Hongrie orientale.)
- B. — Série de *Sophrochaeta*. — Tibias intermédiaires et postérieurs à quatre éperons bien développés, hérissés de fortes épines aussi longues que les éperons. Hanches postérieures très rapprochées. Organe copulateur petit : pénis droit, sans fossettes ; sac interne sans pièces chitineuses, peu différencié. Renferme le genre *Sophrochaeta* Reitt. (Alpes de Transylvanie).
- C. — Série de *Apholeuon*. — Tibias intermédiaires et pos-

térieurs à deux éperons internes; les deux éperons externes manquent ou sont très petits. Bord externe des tibias inerme. Organe copulateur à pénis aplati au sommet, à styles latéraux renflés et coudés au milieu de leur longueur,




FIG. 19. Pénis de *Haplotropidius pubescens* J. Mull., face dorsale, $\times 56$.




FIG. 20. Sac interne du pénis de *Apholeuonus longicollis* Reitt., identique chez tous les genres de la série, $\times 112$.

à sac interne bien différencié, pourvu d'une pièce longitudinale et impaire dans son fond et d'une grosse épine médiane et impaire au milieu de sa face ventrale. Renferme les genres suivants qui se disposent en une remarquable série linéaire : *Proleonhardia*, nov. (Son organe copulateur mâle m'est inconnu.), *Charonites* Apf., *Adelopidius* Apf., *Leonhardia* Reitt., *Haplotropidius* J. Müll., *Apholeuonus*, Reitt., *Protobracharthron* Reitt., *Parapropus* Ganglb. (Bosnie-Herzégowine.)

D. — Série de *Leptodirus*. — Tibias intermédiaires et postérieurs inermes, pourvus seulement de deux éperons internes. Organe copulateur mâle non aplati au sommet, mais épineux, parfois tordu en S ou renflé en massue. Les styles latéraux ne sont ni renflés, ni coudés à leur milieu; le sac interne est en général peu différencié (sauf chez *Bathyscimorphus*); son armature, lorsqu'elle existe, con-

siste en pièces paires et il n'existe jamais une grosse épine médiane et impaire au milieu de la face ventrale du sac. Renferme les genres *Hohenwartia*, nov., *Bathyscimorphus*, nov., *Spelaeodromus* Reitt., *Leptodirus* Schmidt. (Carniole.) Il n'existe pas ici de série linéaire comme dans le groupement *Apholeuonus* : il n'y a pas de termes intermédiaires




FIG. 21. Pénis de *Hohenwartia Freyeri* Mill., face dorso-latérale, $\times 75$.




FIG. 22. Pénis de *Bathyscimorphus byssinus-acuminatus* Mill., face dorsale, avec son sac interne pourvu de pièces chitineuses, $\times 75$.




FIG. 23. Pénis de *Leptodirus Hohenwarti* Schmidt, face dorsale, sans sac interne différencié, $\times 56$.

connus entre *Hohenwartia* et *Leptodirus*, car *Bathyscimorphus* et *Spelaeodromus* doivent être considérés comme des genres aberrants, détachés isolément de la souche des *Leptodirus*.

IV. — GROUPE **ANTROHERPONA**

TABEAU DES GENRES DES ANTROHERPONA

1. Tarses antérieurs des mâles de 4 articles. Épimères mésothoraciques soudés complètement aux épisternes. Petite taille; forme ramassée. Type : *S. Novaki* J. Müll. . . . gen. **Spelaeobates**.

- Tarses antérieurs des mâles de 5 articles. Épimères mésothoraciques indépendants des épisternes. Grande taille; forme très allongée et très grêle. Type : *A. cylindricolle* Apl. gen. **Antroherpon**.

SÉRIES ÉVOLUTIVES DES ANTROHERPONA

Le groupe est nettement diphyllétique et la différence tarsale chez les mâles suffit à séparer une série de *Spelaeobates* de la série de *Antroherpon*. Chez les deux, l'organe copulateur mâle est très simple, grêle, sans sac interne distinct. La série de *Spelaeobates* semble spéciale aux îles de Dalmatie; celle d'*Antroherpon* est distribuée en Bosnie, Herzégowine, Monténégro et en Dalmatie continentale.

D. — CATALOGUE DES BATHYSCIE

I. — GROUPE EURYSCAPITI

A. — FORMES ARCHAÏQUES

Gen. **Sciaphyes**, nov.

sibiricus Reitter, 1887, D. ent. Zs., XXXI, 276. Vladivostok

Gen. **Adelopsella** Jeannel.

Jeannel, 1908, Paris Bull. Soc. ent., 182.

bosnica Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., Bosnie
XXIII, 20.

Gen. **Bathysciola**, nov.

syn. : *Bathyscia* auctorum, nec Schiödte.

Peyroni Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 180. Syrie

syn. : *syriaca* Reitt., 1885, Brünn Verh.
natf. Ver., XXIII, 21.

persica Abeille, 1881, Paris Bull. Soc. ent., 9. Perse

pusilla Motschulsky, 1844, Moscou Bull. Soc. Nat.,
I, 175. Caucase

Fausti Reitter, 1883, Rev. mensuelle d'Entom., 72. Russie or.

silvestris Mostchulsky, 1856, Étud. entom., 36. Carniole, Croatie

syn. : *celata* Hampe, 1861, Wiener ent. Mo-
nats., V, 65.

- pumilio* Reitter, 1885. Brünn. Verh. natf. Ver.. Ligurie, Toscane
XXIII, 25.
syn. : *Murialdii* Balbi, 1888. D. ent. Zs.,
XXXII, 331.
- tarsalis* Kiesenwetter, 1861. Berliner ent. Zs., Mont-Rose
V, 377.
syn. : *Kerimi* Fairmaire, 1872, Genova Ann.
Mus. civ. St. nat., III, 54.
- sarteanensis* Bargagli, 1870. Bull. ent. Ital., II, 175. Italie
syn. : *delicata* Reitter, 1885. D. ent. Zs.,
XXIX, 375.
- subterranea* H. Krauss, 1900. Wien Verh. zool. Ancône
bot. Ges., L, 292.
- Danryi* Abeille, 1885, Paris Bull. Soc. ent., 9. Sardaigne
- *
* *
- Aubei* Kiesenwetter, 1850, St. ent. Ztg., XI, 223. Provence
var. ♂ *epuraeoides* Fairmaire, 1869, St. ent.
Ztg., XX, 231. Alpes-Maritimes
subsp. *foveicollis* Peyerimhoff, 1904, Paris Basses-Alpes
Bull. Soc. ent., 216.
subsp. *Champsauri* Peyerimhoff, 1904, Pa- Basses-Alpes
ris Bull. Soc. ent., 215.
subsp. *brevicollis* Abeille, 1882, Rev. Ent., Alpes-Maritimes
Caen, I, 19.
var. *brevicollis-nicaeensis* Peyerimhoff, 1905, Nice
Paris Bull. Soc. ent., 300.
subsp. *silvicola* Jeannel, 1910, Paris Bull. Piémont
Soc. ent., 51.
subsp. *subalpina* Fairmaire, 1869, St. ent. Hautes-Alpes
Ztg., XX, 231.
subsp. *Solarii* Doderò, 1900, Genova Ann. Ligurie
Mus. civ. St. nat., XXXVII, 281.
subsp. *Guedeli* Jeannel, 1910, Paris Bull. Piémont
Soc. ent., 52.
- opaca* Abeille, 1884, Rev. Ent., Caen, III. Aigoual]
muscorum Dieck, 1869, Berliner ent. Zs., XIII, 349. Ligurie
syn. : *frondicola* Reitter, 1885, Brünn
Verh. natf. Ver., XXIII, 25.

Destefanii Ragusa, 1881. Naturalista sicil., Palermo, I, 6. Sicile

syn. : *muscorum* Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 25 (nec Dieck).

* * *

Majori Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 24. Sardaigne

Gestroi Fairmaire, 1872, Genova Ann. Mus. civ. St. nat., III, 54. Sardaigne

* * *

Lostiai Dodero, 1904, Genova Ann. Mus. civ. St. nat., XLI, 58. Sardaigne

* * *

Halbherri Reitter, 1887, D. ent. Zs., XXXI, 276. Tyrol

ovoidea Fairmaire, 1869, St. ent. Ztg., XX, 231. Alp.-Mar. ?

Robiati Reitter, 1889, Genova Ann. Mus. civ. St. nat., XXVII, 293. Côte

* * *

ovata Kiesenwetter, 1850, St. ent. Ztg., XI, 223. Pyrénées françaises

asperula Fairmaire, 1857, Paris Ann. Soc. ent., 131. France mérid.

subsp. *Simoni* Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 199. Lioran

subsp. *intermedia* Jeannel, 1909, Paris Bull. Soc. ent., 19. Ariège

subsp. *tulpa* Normand, 1907, Paris Bull. Soc. ent., 121. Ariège, Aude

Linderi Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 179. Cévennes.

syn. : *Mayeti* Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 179.

subsp. *nemausica* Chobaut, 1903, Paris Bull. Soc. ent., 264. Gard

subsp. *mialetensis* Abeille, 1881, Paris Bull. Soc. ent., 9. Gard

Schiödti Kiesenwetter, 1850, St. ent. Ztg., XI, 223. Pyrénées françaises.

subsp. *subasperata* Sauley, 1872, Synopsis, 22. Ariège

- subsp. *Grenieri* Sauley, 1872, Synopsis, 22. Pyrénées-Orient.
 subsp. *Larcennei* Abeille, 1883, Cat. Col. Gers
 Gers et Lot-et-Gar., Append., 1.
 subsp. *grandis* Fairmaire, 1856, Paris B.-Pyr. H.-Pyr.
 Ann. Soc. ent., 525.
meridionalis Duval, 1854, Paris Ann. Soc. ent., 36. Gers
lapidicola Sauley, 1872, Synopsis, 22. Ariège
nitidula Normand, 1907, Paris Bull. Soc. ent., 272. Ariège
parallela Jeannel, 1907, Paris Ann. Soc. ent., 422. Basses-Pyrénées.
rugosa Sharp, 1872, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Prov. basques esp.
 nat., I, 271.

B. — SÉRIE DE PHOLEUONELLA

Gen. *Pholeuonella*, nov.

- Erberi* Schaufuss, 1863, Wien Verh. zool. bot. Ges., Dalmatie
 XIII, 1221.
Ganglbaueri Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., Dalmatie
 XXVI, 320.
curzolensis Ganglbauer, 1902, Wien Verh. zool. Ile Curzola
 bot. Ges., LII, 47.
merditana Apfelbeck, 1907, Wien Sitz.-Ber. Ak. Albanie
 Wiss., CXVI, 520.
kerkyrana Reitter, 1884, D. ent. Zs., XXVIII, 115. Ile Corfou

C. — SÉRIE DE PARABATHYSCIA

Gen. *Parabathyscia* Jeannel.Jeannel, 1908, Arch. Zool. Paris, IV^e Sér., VIII, 308.

- Wollastoni* Janson, 1857, Entom. Annual, 70. Côtes de la Manche,
 Gers.
corsica Abeille, 1885, Paris Bull. Soc. ent., 179. Corse
Grouvellei Abeille, 1882, Rev. Ent., Caen, I, 17. Nice
Doriai Fairmaire, 1872, Genova Ann. Mus. civ. Gênes
 St. nat., III, 55.
Spagnoloi Fairmaire, 1882, Genova Ann. Mus. Alpes-Maritimes
 civ. St. nat., XVIII, 446.
 subsp. *brevipilis* Doderò, 1900, Genova Ligurie
 Ann. Mus. civ. St. nat., XL, 417.

- ligurica* Reitter, 1889, Genova Ann. Mus. civ. St. Ligurie
nat., XXVII, 293.
- Doderoi* Fairmaire, 1882, Genova Ann. Mus. civ. Gênes
St. nat., XVIII, 446.

D. — SÉRIE DE SPELÆOCHLAMYS

Gen. *Anillochlamys* Jeannel.

Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist., nat., XXXVIII, 472.

- Bueni* Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Alicante
nat., XXXVIII, 473.
- tropicus* Abeille, 1881, Paris Bull. Soc. ent., 9. Carthagena.
var. *apicalis* Jeannel, 1910, Madrid Act.
Soc. esp. Hist. nat., XXXVIII, 473.

Gen. *Spelaeochlamys* Dieck.

Dieck, 1870, Berliner ent. Zs., XIV, 93.

- Ehlersi* Dieck, 1870, Berliner ent. Zs., XIV, 93. Alicante

E. — SÉRIE DE SPEOCHARIS

Gen. *Speocharis* Jeannel.

Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. nat., XXXVIII, 464.

Syn. : *Quaestus* Schaufuss, 1861, St. ent. Ztg., XIII, 424.

Syn. : *Quaesticulus* Schaufuss, 1861, St. ent. Ztg., XIII, 426.

- Uhagoni* Sharp, 1872, Madrid Act. Soc. esp. Santander
Hist. nat., I, 271.

* * *

- arcanus* Schaufuss, 1861, St. ent. Ztg., XIII, 425. Santander
- Breuili* Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Oviedo
nat., XXXVIII, 465.
- Perezi* Sharp, 1872, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Oviedo
nat., I, 269.

* * *

- adnexus* Schaufuss 1861, St. ent. Ztg., XIII, 427. Santander
- vasconicus* La Brûlerie, 1872, Paris Ann. Soc. ent., Viscaya
448.

autumnalis Escalera, 1898, Madrid Act. Soc. Santander
esp. Hist. nat., XXVII, 37.

Cisnerosi Perez-Arcas, 1872, Madrid An. Soc. esp. Madrid
Hist. nat., I, 127.

* *

Sharpi Escalera, 1898, Madrid Act. Soc. esp. Santander
Hist. nat., XXVII, 37.

Escaleraei Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Santander
Hist. nat., XXXVIII, 466.

flaviobrigensis Uhagon, 1881, Madrid Act. Soc. Vizcaya
esp. Hist. nat., X, 121.

cantabricus Uhagon, 1881, Madrid Act. Soc. esp. Vizcaya
Hist. nat., X, 118.

* *

Seeboldi Uhagon, 1881, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Vizcaya
nat., X, 115.

flicornis Uhagon, 1881, Madrid Act. Soc. esp. Vizcaya
Hist. nat., X, 113.

Minos Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Santander
nat., XXXVIII, 467.

Gen. *Breullia* Jeannel.

Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. nat., XXXVIII, 468,

triangulum Sharp, 1872, Madrid Act. Soc. esp. Oviedo
Hist. nat., I, 268.

cuneus Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Vizcaya
nat., XXXVIII, 469.

tibialis Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Santander.
nat., XXXVIII, 470.

F. — SÉRIE DE SPEONOMUS

Gen. *Speonomus* Jeannel.

Jeannel, 1908, Arch. Zool. Paris, IV^e sér., VIII, 299.

Subgen. *Phacomorphus* Jeannel.

Jeannel, 1908, L'Abeille, XXI, 60.

Mascarauxi Deville, 1905, Paris Bull. Soc. ent. 160. Basses-Pyrénées

Boardei Peyerimhoff, 1908, Paris Bull. Soc. ent., 302. Basses-Pyrénées

Subgen. *Speonomus*, s. str.

- Delarouzei* Fairmaire, 1860, Paris Ann. Soc. ent., 631. Pyrénées-Orient.
 syn. : *Brucki* Fairmaire, 1863, Cat. Grenier, 8.
infernus Dieck, 1869, Berliner ent. Zs., XIII, 348. Ariège, H.-Gar.

* * *

- Proserpina* Abeille, 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. nat., XII, 155. Aude, Ariège
Chardon Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 179. Aude
 subsp. *Pueli* Chobaut, 1903, Paris Bull. Soc. ent., 221. Aude
 subsp. *Hecate* Abeille, 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. nat., XII, 154. Aude
 subsp. *aletinus* Abeille, 1883, Cat. Col. Gers et Lot-et-Gar., Append., 3. Aude
stygus Dieck, 1869, Berliner ent. Zs., XIII, 348. Ariège
 syn. : *clavatus* Sauley 1872, Synopsis, 20.
 subsp. *crassicornis* La Brûlerie, 1872, Paris Ann. Soc. ent., 447. Ariège
 subsp. *Tisiphone* Jeannel, 1908, L'Abeille, XXXI, 62. Ariège
 subsp. *Sauleyi* Abeille, 1872, Synopsis, 19. Ariège
Piochardi Abeille, 1873, Paris Bull. Soc. ent., 98. Ariège
longicornis Sauley, 1872, Synopsis, 19. Ariège
 subsp. *fuxeensis* Jeannel, 1908, L'Abeille, XXXI, 64. Ariège
 subsp. *hermensis* Abeille, 1873, Paris Bull. Soc. ent., 98. Ariège
 subsp. *Perieri* La Brûlerie, 1872, Paris Ann. Soc. ent., 446. Ariège
 var. *Perieri-gracilis* Jeannel, 1907, Paris Bull. Soc. ent., 245. Ariège
 subsp. *Fauvcaui* Jeannel, 1907, Paris Bull. Soc. ent., 245. Ariège
 subsp. *Pandellei* Abeille, 1883, Cat. Col. Gers et Lot-et-Gar., Append., 2. Ariège
curvipes La Brûlerie, 1872, Paris Ann. Soc. ent., 444. Aude, Ariège

- subsp. *subcurvipes* Abeille, 1878, Toulouse Aude
Bull. Soc. Hist. nat., XII, 154.
- subsp. *subrectipes* Abeille, 1878, Toulouse Aude
Bull. Soc. Hist. nat., XII, 154.
- Fagniezi* Jeannel, 1910, Paris Bull. Soc. ent., 49. Pyrénées-Orient
- pyrenaeus* Lespès, 1857, Ann. Sc. nat. (Zool.), Ariège
Paris, VII, 283.
- syn. : Barnevillei Sauley, 1872, Synopsis, 18.
- subsp. *Discontignyi* Sauley, 1872, Synop- Ariège
sis, 18.
- subsp. *novemfontium* La Brûlerie, 1872, Ariège
Paris Ann. Soc. ent., 445.
- subsp. *Nadari* Jeannel, 1906, Paris Bull. Ariège
Soc. ent., 244.
- Diecki* Sauley, 1872, Synopsis, 18. Ariège
- Ehlersi* Abeille, 1872, Synopsis, 17. Haute-Garonne.
- *
* *
- sophosinus* Sauley, 1872, Synopsis, 21. Ariège
- hydrophilus* Jeannel, 1907, Paris Bull. Soc. ent., Ariège
127.
- syn. : stygius Sauley, 1872, Synopsis, 20
(nec Dieck.).
- subsp. *Normandi* Jeannel, 1906, Paris Ariège
Bull. Soc. ent., 246.
- Abeillei* Sauley, 1872, Synopsis, 20. Ariège
- Bonvouloiri* Duval, 1859, Glânares entom., I, 34. Pyrénées-Orient.
- syn. : Dohrni Schaufuss, 1862, St. ent.
Ztg., XXIII, 126.
- speluncarum* Delarouzée, 1857, Paris Bull. Soc. Basses-Pyrénées
ent., 94.
- subsp. *navaricus* Jeannel, 1907, Paris Bull. Basses-Pyrénées
Soc. ent., 247.
- Rudauxi* Jeannel, 1909, Paris Bull. Soc. ent., 18. Basses-Pyrénées
- Bepmalei* Jeannel, 1908, L'Abeille, XXXI, 69. Hautes-Pyrénées
- Alexinae* Jeannel, 1906, Paris Bull. Soc. ent., 23. Basses-Pyrénées
- subsp. *ittanus* Jeannel, 1906, Paris Bull. Basses-Pyrénées
Soc. ent., 24.
- Elgueae* Abeille, 1904, Paris Bull. Soc. ent., 243. Basses-Pyrénées

* * *

- fugitivus* Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., Montserrat
XXIII, 35.
- Bolivari* Escalera, 1898, Madrid Act. Soc. esp. Huesca
Hist. nat., XXVII, 38.
- Oberthuri* Jeannel, 1910, Madrid Act. Soc. esp. Vizcaya
Hist. nat., XXXVIII, 471.
- Crotchi* Sharp, 1872, Madrid Act. Soc. esp. Hist. Navarra
nat., I, 127.
- Mazarredoi* Uhagon, 1881, Madrid Act. Soc. esp. Guipuzcoa
Hist. nat., X, 123.

Gen. **Bathysciella** Jeannel.

Jeannel, 1906, Paris Bull. Soc. ent., 23.

- Jeanneli* Abeille, 1904, Paris Bull. Soc. ent., 242. Basses-Pyrénées

Gen. **Perrinia** Reitter.

Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 16.

- Kiesenswetteri* Dieck, 1869, Berliner ent. Zs., XIII, Montserrat
350.

Gen. **Troglophyes** Abeille.

Abeille, 1894, Paris Bull. Soc. ent., 27.

- Gavoyi* Abeille, 1894, Paris Bull. Soc. ent., 27. Aude
- Bedeli* Jeannel, 1906, Paris Bull. Soc. ent., 275. Pyrénées-Orient.
- Ludovici* Chobaut, 1903, Paris Bull. Soc. ent., 263. Aude

* * *

- oblongulus* Reitter, 1908, Wiener ent. Ztg., XXVII, ?
116.

Gen. **Troglocharinus** Reitter.

Reitter, 1908, Wiener ent. Ztg., XXVII, 116.

- Ferreri* Reitter, 1908, Wiener ent. Ztg., XXVII, Barcelona
116.

Gen. **Trocharanis** Reitter.

Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 12.

- Mestrei* Abeille, 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. Aude, Ariège
nat., XII, 152.

Gen. **Antrocharis** Abeille.

Abeille, 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. nat., XII, 151.

Syn. : *Antrodiaetus* Abeille, 1876, Pet. Nouv. ent. Deyrolle, 29 ; nec
Ausserer, 1871 (*Araneae Aviculariidae*).

Querilhaci Lespès, 1857, Ann. Sc. nat. (Zool.), Ariège
Paris, VII, 283.

syn. : dispar Abeille, 1878, Toulouse Bull.
Soc. Hist. nat., XII, 152.

G. — **SÉRIE DE DIAPRYSIUS**Gen. **Diaprysius** Abeille.

Abeille 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. nat., XII, 149.

syn. : *Ardecheus* Reitter, 1908, Wiener ent. Ztg., XXVII, 115.

Sicardi V. Mayet, 1907, Paris Bull. Soc. ent., 194. Hérault

*
* *

Serullazi Peyerimhoff, 1904, Paris Bull. Soc. ent., Ardèche
185.

subsp. *Peyerimhoffi* Jeannel, 1910, Paris Ardèche
Bull. Soc. ent., 12.

Fagniezi Jeannel, 1910, Paris Bull. Soc. ent., 12. Gard

Mazaurici V. Mayet, 1903, Paris Bull. Soc. ent., Gard
139.

caudatus Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 182. Ardèche

caudatissimus Abeille, 1876, Pet. Nouv. ent. Dey- Ardèche
rolle, 29.

H. — **SÉRIE DE CYTODROMUS**Gen. **Royerella**, nov.

Tarissani Bedel, 1878, Paris Bull. Soc. ent., 76. Drôme

Villardi Bedel, 1884, Paris Bull. Soc. ent., 75. Ain

Gen. **Cytodromus** Abeille.

Abeille, 1876, Pet. Nouv. ent. Deyrolle, 29.

dapsoides Abeille, 1875, Paris Bull. Soc. ent., 203. Drôme

Gen. *Speodiaetus* Jeannel.Jeannel, 1908, Arch. Zool. Paris, IV^e sér., VIII, 296.*galloprovincialis* Fairmaire, 1860, Paris Ann. Soc. ent., 631. VarGen. *Troglodromus* Deville.

Deville, 1901, L'Abeille, XXX, 59.

Bucheti Deville, 1898, Paris Bull. Soc. ent., 196. Alpes-Maritimessubsp. *Bonafonsi* Deville, 1901, L'Abeille, XXX, 72. Alpes-Maritimessubsp. *Gaveti* Deville, 1901, L'Abeille, XXX, 59. Alpes-Maritimessubsp. *pœnitens* Deville, 1902, Paris Ann. Soc. ent., 708. Alpes-Maritimessubsp. *Carboneli* Deville, 1902, Paris Ann. Soc. ent., 708. Alpes-MaritimesGen. *Isereus* Reitter.

Reitter, 1886, Wiener ent. Ztg., V, 100.

Xambeui Argod, 1885, Paris Bull. Soc. ent., 163. IsèreII. — GROUPE **GYNOMORPHI**A. — SÉRIE DE **BATHYSCIA**Gen. *Bathyscia* Schiödte.

Schiödte, 1849, Spec. Faun. subterr., 10.

syn. : *Adelops* Lacordaire, Gen. Col., II, 208 (nec Tellkampff).syn. : *Bathyscina* Reitter, 1908, Wiener ent. Ztg., XXVII, 117.*montana* Schiödte, 1843, Spec. Faun. subterr., 11. Carniole, Croatie, Styriesyn. : *triangularis* Motschulsky, 1851. Moscou Bull. Soc. Nat., VIII, 594.syn. : *rotundata* Motschulsky, 1851. Moscou Bull. Soc. Nat., VIII, 578.syn. : *Tellkampfi* Schmidt, 1852, Laibacher Ztg., n° 146.syn. : *longipennis* Joseph, 1872, Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur (1871), 178.

- var. *forticornis* Joseph, 1872, Breslau Jah- Carniole
resber. Ges. vaterl. Cultur (1871), 178.
subsp. *hungarica* Reitter, 1878, D. ent. Maramaros
Zs., XXII, 63.
subsp. *Apfelbecki* Ganglbauer, 1899, Käf. Bosnie
Mitteleur., III, 106.
var. *Apfelbecki-jablanicensis* Ganglbauer, Herzégowine.
1899, Käf. Mitteleur., III, 107.

Gen. **Bathyscidius**, nov.

- tristiculus* Apfelbeck, 1906, Glasnik z. Mus. Dalmatie
Bosn. Herzég., III, 247.

B. — **SÉRIE DE HEXAURUS**Gen. **Hexaurus** Reitter.

Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 11.

- Merkli* Frivaldszky, 1879, Termesz. Fuzet., III, 232. Albanie
syn. : *affinis* Frivaldszky, 1879, Termesz.
Fuzet., III, 232.
subsp. *similis* Frivaldszky, 1879, Termesz.
Fuzet., III, 232.

C. — **SÉRIE DE SPEOPHYES**Gen. **Speophyes**, nov.

- lucidulus* Delarouzée, 1860, Paris Ann. Soc. ent., Hérault
27.

Gen. **Phaneropella**, nov.

- Lesinae* Reitter, 1881, D. ent. Zs., XXV, 216. Dalmatie
syn. : *Karamani* Reitter, 1884, D. ent. Zs.,
XXVIII, 116.
turcica Reitter, 1884, D. ent. Zs., XXVIII, 115. Asie Mineure

D. — **SÉRIE DE APHAOBIUS**Gen. **Bathysciotes**, nov.

- Hoffmanni* Motschulsky, 1856, Ét. entom., 36. Carniole
Khevenhülleri L. Miller, 1850, Wien Verh. zool. Carniole. Istrie
bot. Ges., 1, 131.

syn. : subrotundata Reitter, 1885, Brünn
Verh. natf. Ver., XXIII, 19.

subsp. *croatica* L. Miller, 1867, Wien Verh. Croatie
zool. bot. Ges., XVII, 551.

subsp. *Horvathi* Csiki, 1901, Termesz. Croatie, Istrie
Fuzet., XXIV, 487.

Gen. **Aphaobius** Abeille.

Abeille, 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. nat., XII, 148.

Milleri Schmidt, 1855, Wien Verh. zool. bot. Ges., Carniole
V, 131.

Heydeni Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., Carniole
XXIII, 17.

Gen. **Oryotus** L. Miller.

L. Miller, 1856, Wien Verh. zool. bot. Ges., VI, 627.

Schmidtii L. Miller, 1856, Wien Verh. zool. bot. Carniole
Ges., VI, 627.

subsp. *subdentatus* J. Müller, 1905, Wiener Istrie
ent. Ztg., XXIV, 32.

Micklitzii Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., Carniole
XXIII, 14.

E. — **SÉRIE DE SPEONESIOTES**

Gen. **Speonesiotes**, nov.

narentinus L. Miller, 1861, Wiener ent. Monats., Dalmatie, Herzég.
V, 266.

syn. : pruinus Schaufuss, 1853, Wien
Verh. zool. bot. Ges., XIII, 1222.

syn. : eurycnemis Reitter (1), 1904.
Wiener ent. Ztg., XXIII, 26.

subsp. *hirsutus* Jeannel, nov. (2). Dalmatie

(1) Tous les exemplaires mâles du *S. narentinus* présentent la conformation des tibias postérieurs par laquelle Reitter a caractérisé son espèce *eurycnemis*.

(2) *S. narentinus*, subsp. *hirsutus*, nov. — Un exemplaire mâle de la coll. A. Grouvelle, étiqueté « Dalmatie » se distingue du *narentinus* typique par les caractères suivants :

Ponctuation beaucoup plus fine et plus superficielle. Sur le prothorax, les points sont beaucoup plus petits et plus espacés; sur les élytres, les points sont alignés en travers beaucoup plus régulièrement et figurent de véritables stries. La pubescence est rare, mais deux fois plus longue que chez *narentinus*; elle est pâle et non dorée. Les élytres sont déprimés sur la suture. Pour le reste, il est identique au *narentinus* typique.

Il est probable qu'il doit habiter une grotte spéciale.

dorotkanus Reitter, 1881. D. ent. Zs., XXV, 215. Dalmatie,
Herzég.

* * *

issensis J. Müller, 1903. Münchener Kol. Zs., I, Dalmatie
194.

insularis Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., Dalmatie
XXVI, 319.

Paganetti Ganglbauer, 1902, Wien Verh. zool. Dalmatie
bot. Ges., LII, 45.

Gobanzi Reitter, 1898, D. ent. Zs., XLII, 339. Dalmatie

Fabianii Doderò, 1904, Genova Ann. Mus. civ. Vénétie
St. nat., XLI, 55.

antrorum Doderò, 1900, Genova Ann. Mus. civ. Vénétie
St. nat., XXXVII, 415.

syn. : *brachycerus* Doderò (1), 1900, Ge-
nova Ann. Mus. civ. St. nat., XXXVII,
415.

F. — SÉRIE DE LEONHARDELLA

Gen. **Proleonhardella**, nov.

Matzenaueri Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., Bosnie
XXVI, 317.

Gen. **Leonhardella** Reitter.

Reitter, 1903, Wiener ent. Ztg., XXII, 209.

syn. : *Victorella* Reitter (2), 1908, Wiener ent. Ztg., XXVII, 111.

angulicollis Reitter, 1903, Wiener ent. Ztg., Herzégowine
XXII, 209.

subsp. *setnikana* Reitter, 1908, Entom. Herzégowine
Blätter, 8.

antennaria Apfelbeck, 1907, Soc. entomol., Zü- Monténégro
rich, XXII, 89.

subsp. *Setniki* Reitter, 1907, Wiener ent. Monténégro
Ztg., XXVI, 321.

(1) Je n'ai pas vu *S. antrorum* Dod., mais il semble bien résulter de la bonne description de son auteur que *antrorum* typique doit être le mâle (à tarsi antérieurs tétramères) et la var. *brachycerus* la femelle.

(2) Les différences que donne Reitter ne sont certainement pas suffisantes pour isoler *L. antennaria* dans un sous-genre spécial.

Gen. **Anillocharis** Reitter.

Reitter, 1903, Wiener ent. Ztg., XXII, 231.

stenopterus Formanek, 1906, Wiener ent. Ztg., Monténégro
XXV, 151.*Otonis* Reitter 1903, Wiener ent. Ztg., XXII, 232. Herzégowine.
subsp. *plutonius* Reitter, 1907, Wien. ent. Herzégowine
Ztg., XXVI 344.G. — **SÉRIE DE PHOLEUONOPSIS**Gen. **Pholeuonopsis** Apfelbeck.

Apfelbeck, 1901, Wien Verh. zool. bot. Ges., LI, 14.

syn. : *Blattodromus* Reitter, 1904, Wiener ent. Ztg., XXIII, 153.*herculeanus* Reitter, 1904, Wiener ent. Ztg., Bosnie
XXIII, 153.*setipennis* Apfelbeck, 1907, Glasnik z. Mus. Bosn. Bosnie
Herzég., XIX, 304.*Ganglbaueri* Apfelbeck, 1901, Wien Verh. zool. Bosnie
bot. Ges., LI, 14.*Grabowskii* Apfelbeck, 1907, Glasnik z. Mus. Bosn. Herzégowine
Herzég., XIX, 402.Gen. **Silphanillus** Reitter.

Reitter, 1903, Wiener ent. Ztg., XXII, 210

Leonhardi Reitter, 1903, Wiener ent. Ztg., XXII. Herzégowine
211.III. — GROUPE **BRACHYSCAPITI**A. — **SÉRIE DE DRIMEOTUS**Gen. **Mehadiella** Csiki.

Csiki., 1899, Termesz. Füzet., XXII, 247.

syn. : *Frivaldszkya* Ganglbauer, 1899, Käf. Mitteleur., III, 98.*Paveli* Frivaldszky 1880, Termesz. Füzet., IV, Krasso-Szoreny.
183.Gen. **Drimeotus** L. Miller.

L. Miller, 1856, Wien Verh. zool. bot. Ges., VI, 635.

Subgen. *Drimeotus*, s. str.*Ormayi* Reitter, 1889, D. ent. Zs., XXXIII, 301. Torda-Aranyos

* *

- Chyzeri* Biro, 1897, Termesz. Fuzet., XXI, 447. Bihar
Entzi Biro, 1897, Termesz. Fuzet., XXI, 448. Bihar
Kovacsí L. Miller, 1856, Wien Verh. zool. bot. Bihar
 Ges., VI, 635.
Horvathi Biro, 1897, Termesz. Fuzet., XXI, 448. Bihar

Subgen. *Fericeus* Reitter.

Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 13.

- Kraatzí* Frivaldszky, 1857, Wien Verh. zool. bot. Bihar
 Ges., VII, 45.

Gen. *Pholeuon* Hampe.

Hampe, 1856, Wien Verh. zool. bot. Ges., VI, 463.

syn. : *Apropeus* Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 10.Subgen. *Parapholeuon* Ganglbauer.

Ganglbauer, 1887, D. ent. Zs., XXXI, 95.

- gracile* Frivaldszky, 1861, Wiener ent. Monats., Bihar
 V, 387.

- hungaricum* Csiki, 1904, Ann. Hist. nat. Mus. Szolnok-Doboka.
 Hung., Budapest, II, 565.

Subgen. *Pholeuon*, s. str.

- angusticollis* Hampe, 1856, Wien Verh. zool. bot. Bihar
 Ges., VI, 463.

- leptoderum* Frivaldszky, 1857, Wien Verh. zool. Bihar
 bot. Ges., VII, 44.

syn. : Hazayi Frivaldszky, 1884, Termesz.
 Fuzet., VIII, 280.

B. — SÉRIE DE SOPHROCHAETA

Gen. *Sophrochaeta* Reitter.

Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver., XXIII, 17.

- insignis* Frivaldszky, 1880, Termesz. Fuzet., IV, Krasso-Szoreny.
 181.

- Merkli* Frivaldszky, 1883, Termesz. Fuzet., VII, 12. Krasso-Szoreny.

- Reitteri* Frivaldszky, 1884, Termesz. Fuzet., VIII, Krasso-Szoreny.
 280,

C. — SÉRIE DE APHOLEUONUS

Gen. **Proleonhardia**, nov.

Neumanni Apfelbeck, 1901, Wien Verh. zool. bot. Bosnie
Ges., LI, 14.

Gen. **Charonites** Apfelbeck.

Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., XXVI, 314.

Matzenaueri Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., Bosnie
XXVI, 314.

Gen. **Adelopidius** Apfelbeck.

Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., XXVI, 320.

Sequensi Reitter, 1902, Wiener ent. Ztg., XXI, 223. Bosnie

Gen. **Leonhardia** Reitter.

Reitter, 1901, Wiener ent. Ztg., XX, 128.

Hilfi Reitter, 1901, Wiener ent. Ztg., XX, 128. Herzégowine

Reitteri Breit, 1902, Soc. entomol., Zürich, XVIII, 89. Bosnie

Gen. **Haplotropidius** J. Müller.

J. Müller, 1903, Wien Sitz.-Ber. Ak. Wiss., CXII, 89.

pubescens J. Müller, 1903, Wien Sitz.-Ber. Ak. Dalmatie
Wiss., CXII, 78.

Taxi J. Müller, 1903, Wien Sitz.-Ber. Ak. Wiss., Dalmatie
CXII, 83.

subinflatus Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., Dalmatie
XXVI, 315.

Gen. **Apholeuonus** Reitter.

Reitter, 1889, D. ent. Zs., XXXIII, 369.

longicollis Reitter, 1904, Wiener ent. Ztg., XXIII, Bosnie
255.

syn. : *Sequensi* Reitter, 1906, Soc. entomol.,
Zürich, XXI, 97.

syn. : *nudus* Reitter, 1906, Wiener ent.
Ztg., XXV, 238 (nec Apfelbeck).

nudus Apfelbeck, 1889, Glasnik z. Mus. Bosn. Her- Bosnie
zég., I, 63.

syn. : *Knoteki* Reitter, 1906, Wiener ent
Ztg., XXV, 237.

subsp. *Sturanyi* Apfelbeck, 1906, Soc.
entomol., Zürich, XXI, 113.

Gen. **Protobracharthron** Reitter.

Reitter, 1889, D. ent. Zs., XXXIII, 295.

syn. : *Spelaetes* Apfelbeck (1), 1907, Wiener ent. Ztg., XXVI, 315.

Reitteri Apfelbeck, 1889, Glasnik z. Mus. Bosn. Bosnie
Herzég., I, 63.

Grabowskii Apfelbeck, 1907, Wiener. ent. Ztg., Dalmatie
XXVI, 316.

Gen. **Parapropus** Ganglbauer.

Ganglbauer, 1899, Käf. Mitteleur., III, 83.

syn. : *Leptonotus* || Motschulsky, 1869, Moscou Bull. Soc. Nat., XLII,
253 ; nec Kaup, 1856 (*Pisces Syngnathidae*).

syn. : *Propus* || Abeille, 1878, Toulouse Bull. Soc. Hist. nat., XII, 149 ;
nec Oken, 1838 (*Reptilia Amphisbænidae*).

sericeus Schmidt, 1852, St. ent. Ztg., XIII, 382. Carniole, Croatie

syn. : *intermedius* Hampe, 1870, Berliner
ent. Zs., XIV, 332.

Pfeiferi Apfelbeck, 1908, Glasnik z. Mus. Bosn. Bosnie
Herzeg., XX, 417.

Ganglbaueri Ganglbauer, 1899, Käf. Mitteleur., Bosnie
III, 85.

subsp. *humeralis* Apfelbeck, 1907, Wiener Bosnie
ent. Ztg., XXVI, 318.

D. — **SÉRIE DE LEPTODIRUS**

Gen. **Hohenwartia**, nov.

Freyeri L. Miller, 1855, Wien Verh. zool. bot. Ges., Carniole
V, 506.

subsp. *Netolitzkyi* J. Müller, 1908, Wiener Carniole
ent. Ztg., XXVII, 39.

Robici Ganglbauer, 1899, Käf. Mitteleur., III, 102. Carniole

(1) Je ne puis partager l'opinion de REITTER (1908, p. 106), qui rapproche le *Spelaetes Grabowskii* des *Haplotropidius*. Sa ponctuation, la forme de son prothorax, celle de sa carène, me font penser au contraire qu'il n'y a pas lieu de maintenir même une distinction de sous-genres entre le *Spelaetes* d'Apfelbeck et *Protobracharthron* dont j'ai sous les yeux un type, provenant de la coll. Reitter.

Gen. **Bathyscimorphus**, nov.

- byssinus* Schiödte (1), 1849, Spec. Faun. subterr., Carniole
10.
subsp. *acuminatus* L. Miller, 1855, Wien Carniole
Verh. zool. bot. Ges., V, 507.
subsp. *likanensis* Reitter, 1890, Wiener Croatie
ent. Ztg., IX, 191.
globosus L. Miller, 1855, Wien Verh. zool. bot. Carniole
Ges., V, 507.

Gen. **Spelaeodromus** Reitter.

- Reitter, 1885, Brünn Verh. natf. Ver. XXIII, 10.
Pluto Reitter, 1881, D. ent. Zs., XXV, 214. Croatie

Gen. **Leptodirus** Schmidt.

- Schmidt, 1832, Illyrisches Blatt, n° 3, 9.
syn. : *Leptoderus* Schmidt, 1852, St. ent. Ztg., XIII, 381.
syn. : *Stagobius* Schiödte, 1849, Spec. Faun. subterr., 16.

Subgen. **Astagobius** Reitter.

- Reitter, 1886, Wiener ent. Ztg., V, 315.
angustatus Schmidt, 1852, St. ent. Ztg., XIII, 381. Carniole
syn. : Robici Joseph, 1868, Breslau Jah-
resber. Ges. vaterl. Cultur (1867). 170.

Subgen. **Leptodirus**, s. str.

- Grouvellei* Jeannel, 1910, Paris Bull. Soc. ent., 29. Carinthie
Hohenwarti Schmidt, 1832, Illyrisches Blatt, n° 3, 9. Carniole, Istrie
syn. : *Hochenwartii* Sturm, 1849. Deutschl.
Ins., XX, 93.
syn. : *troglodytes* Schiödte, 1849. Spec.
Faun. subterr., 16.
var. *Deschmanni* Joseph, 1872. Breslau Carniole
Jahresber. Ges. vaterl. Cultur (1871),
175.

(1) *B. byssinus*, loin d'être rare, est très répandu dans toutes les collections où on le trouve mêlé au *B. acuminatus*. Il s'en distingue aisément par ses tarsi antérieurs mâles plus étroits que le tibia au lieu que ceux de *B. acuminatus* sont aussi larges que le tibia ; de plus la structure du pénis est un peu différente. *B. byssinus* habite les grottes du bassin de la Laibach (Adelsberg, Lüegg, Nüssdorf) ; *B. acuminatus* au contraire occupe les bassins de la Kerka et de l'Una (grottes du district de Rudolfswerck et du sud du district de Oberloitsch).

- subsp. *Schmidtii* Motschulsky, 1856, Étud. Carniole
entomol., V, 35.
- subsp. *reticulatus* J. Müller, 1905, Wiener Istrie
ent. Ztg., XXIV, 32.

IV. — GROUPE **ANTROHERPONA**A. — **SÉRIE DE SPELAEOBATES**Gen. **Spelaeobates** J. Müller.

J. Müller, 1901, Wien Verh. zool. bot. Ges., LI, 16.

- Novaki* J. Müller, 1901, Wien Verh. zool. bot. Iles dalmates
Ges., LI, 19.

* * *

- pharensis* J. Müller, 1901, Wien Verh. zool. bot. Iles dalmates
Ges., LI, 20.
- Peneckeii* J. Müller, 1903, Wien Sitz.-Ber. Ak. Iles dalmates
Wiss., CXII, 882.
- Kraussi* J. Müller, 1903, Wien Sitz.-Ber. Ak. Iles dalmates
Wiss., CXII, 885.

B. — **SÉRIE DE ANTROHERPON**Gen. **Antroherpon** Reitter.

Reitter, 1889, D. ent. Zs., XXXIII, 294.

- syn. : *Eumecosoma* J. Müller, 1901, Wien Verh. zool. bot. Ges., LI, 29.
- cylindricolle* Apfelbeck, 1889, Glasnik z. Mus. Bosnie
Bosn. Herzég., I, 61.
- subsp. *thoracicum* Apfelbeck, 1907, Glasnik Bosnie
z. Mus. Bosn. Herzég., XIX, 402.
- Matsenaueri* Apfelbeck, 1907, Glasnik z. Mus. Monténégro
Bosn. Herzég., XIX, 401.
- subsp. *latipenne* Apfelbeck, 1907, Glasnik Monténégro
z. Mus. Bosn. Herzég., XIX, 401.

* * *

- Dombrowskii* Apfelbeck, 1907, Glasnik z. Mus. Dalmatie
Bosn. Herzég., XIX, 303.

- Ganglbaueri* Apfelbeck, 1894, Sarajevo Wiss. Mitth. Bosn. Herzég., II, 513. Herzégowine
- Matulici* Reitter, 1903, Wiener ent. Ztg., XXII, 216. Herzégowine

* * *

- stenocephalum* Apfelbeck, 1901, Wien Verh. zool. bot. Ges., LI, 15. Bosnie
- pygmaeum* Apfelbeck, 1889, Glasnik z. Mus. Bosn. Herzég., I, 61. Bosnie
- Hörmanni* Apfelbeck, 1889, Glasnik z. Mus. Bosn. Herzég., I, 62. Bosnie
- subsp. *hypsophilum* Apfelbeck, 1907, Glasnik z. Mus. Bosn. Herzég., XIX, 402. Herzégowine
- Loreki* Zoufal, 1904, Wiener ent. Ztg., XXIII, 20. Herzégowine.
syn. : Kraussi J. Müller, 1904, Münchener Kol. Zs., II, 38.
- Leonhardi* Reitter, 1902, Wiener ent. Ztg., XXI, 208. Bosnie

SPECIES INCERTÆ SEDIS

1. *Bathyscia* (?) *Vallarsae* Halbherr, 1898, Wiener ent. Ztg., XVII, 180 ; Tyrol. — M'est inconnu. Se placera peut-être dans le genre *Bathysciola* Jeann., à côté du *B. Halbherri* Reitt.
2. *Bathyscia* (?) *minuscule* Abeille, 1901, L'Échange. Moulins, XVII, 68 ; Savoie. — Très insuffisamment décrit. Le *type* (coll. Abeille) est une femelle ; ce sera encore probablement un *Bathysciola* Jeann.
3. *Bathyscia* (?) *Kauti* Apfelbeck, 1907, Wiener ent. Ztg., XXVI, 318 ; Bosnie. — Très insuffisamment décrit.
4. *Bathyscia* (?) *serbica* J. Müller, 1904, Münchener Kol. Zs., II, 41 ; Serbie. — Le mâle est inconnu. D'après la bonne description de J. Müller, il semble qu'il se placera peut-être dans le genre *Proleonhardia* Jeann.
5. *Bathyscia* (?) *thessalica* Reitter, 1887, D. ent. Zs., XXXI, 276 ; Thessalie. — Le *type* unique que j'ai sous les yeux est une femelle. C'est une très remarquable espèce qui devra peut-être servir de *type* à un nouveau genre dans la série des *Hexaurus* Reitt. Mais il faudrait connaître le mâle avant de se prononcer.

6. *Bathyscia* (?) *oviformis* La Brûlerie, 1872, Paris Ann. Soc. ent., 447 ; patrie inconnue. — N'est certainement pas synonyme de *Speonomus zophosinus* Saulcy ; j'ai vu autrefois le *type* (coll. Abeille) et il se pourrait que ce soit un *Speonesiotes* Jeann.
7. *Bathyscia* (?) *Raveli* Doderò, 1904, Genova Ann. Mus. civ. St. nat., XLI, 57 ; île de Capri. — L'auteur ne parle pas de l'organe copulateur mâle. Il doit s'agir d'une espèce du genre *Parabathyscia* Jeann., voisine du *P. Doderoi* Fairm.
8. *Bathyscia* (?) *heteromorpha* Doderò, 1909, Genova Ann. Mus. civ. St. nat., XLIV, 203 ; Côte. — Malgré l'excellente description de Doderò, il est impossible de savoir où cette espèce doit être placée, sans connaître la structure de son organe copulateur mâle.
9. *Bathyscia* (?) *Bucheti* Abeille, 1905, Paris Bull. Soc. ent., 208 ; Alpes-Maritimes. — Encore une espèce insuffisamment décrite : l'auteur ne dit rien des longueurs proportionnelles des articles des antennes. Il est possible que les affinités de cette espèce ne soient pas si superficielles que Abeille le dit avec *lucidula* Delar. et qu'elle appartienne comme lui au genre *Speophyes* Jeann., à tarsi antérieurs mâles tétramères.
10. *Aphaobius* (?) *Maneki* J. Müller, 1909, Wiener ent. Ztg., XXVIII, 281 ; Bulgarie. — Il manque à la très bonne description de J. Müller des renseignements sur l'organe copulateur mâle, pour affirmer qu'il s'agit bien là d'un *Aphaobius* Ab.

E. — INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

1878. ABEILLE DE PERRIN (E.). Note sur les Leptodirites. (*Toulouse Bull. Soc. Hist. nat.*, XII, p. 144-155.)
1899. GANGLBAUER (L.). Die Käfer von Mittel Europa, III. Leptoderini. (*Wien.*)
1902. GANGLBAUER (L.). Zwei neue Bathyscien aus Dalmatien. (*Wien Verh. zool. bot. Ges.*, LII, p. 45-49.)
1880. HORN (G.-H.). Synopsis of the Silphidae of the United States with reference to the genera of other countries. (*American Coleoptera, Philadelphia.*)
1903. JEANNEL (R.). Biospeologica V. Coléoptères (1^{re} série). (*Arch. Zool., Paris*, 4^e série, VIII, n° 3, p. 267-326, pl. XII-XIV.)
1901. MÜLLER (J.). Beitrag zur Kenntniss der Höhlensilphiden. (*Wien Verh. zool. bot. Ges.*, LI, p. 16-33, pl. 1.)

1885. REITTER (E.). Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren.
XII. Silphidae. (*Brünn Verh. natf. Ver.*, XXIII, p. 1-122.)
1886. REITTER (E.). Beitrag zur Systematik der Grotten Silphiden.
(*Wiener ent. Ztg.*, V, p. 313-316.)
1889. REITTER (E.). Bemerkungen und Berichtigungen zu den Clavicornen in der Fauna baltica, 2 Aufl., und Fauna transsylvanica, von Dr G. Seidlitz. (*D. ent. Zs.*, p. 289-318.)
1908. REITTER (E.). Dichotomische Übersicht der blinden Silphiden Gattungen. (*Wiener ent. Ztg.*, XXVII, p. 103-118.)
1861. SCHAUFUSS (L.-W.). Über sieben augenlose Silphiden Gattungen
(*Dresden Sitz.-Ber. Isis*, 1861, p. 18.)
1849. SCHIÖDTE (J.-C.). Specimen Faunae subterraneae (*Kgl. Danske Videnskab. Selsk. Skrift.*, 5 Raekke, naturv. og mat. Afdel., 2 Bind, 39 p., pl. I-IV.)
1889. SEIDLITZ (G.). Fauna baltica. Zweite Auflage. XLVII, p. 74-78.).